

대장내시경 검사안내문

쿨프렙산 복용법

검사자명	
검진일	
내원시간	



평소 심장관련 약 복용 중이거나 혈압이 높은 분의 경우 미리 말씀하여 주시고, 심전도 및 기초검사를 통하여 안전 여부를 미리 파악하오며 수면 유지에 위험이 있다고 판단되어지는 경우 검사가 불가 할 수 있음을 알려드립니다.

주의 사항 및 안내사항

- 검사일 3일전부터 물을 수시로 많이 드시는게 좋습니다.
- 대장의 내부가 깨끗하게 되어야 정확한 검사를 편하게 받으실 수 있습니다.
대장이 깨끗하게 청소되지 않으면 검사 도중 대장 내에 많은 공기를 넣기 때문에 고통스러울 수 있습니다.
- 검사전(3일전) 붉은색의 음식이나 고기류 및 씨 많은 과일(참외, 수박, 포도)이나 야채(오이, 콩나물, 호박, 시금치, 고사리 등), 해조류(김, 미역), 잡곡밥은 섭취를 피하시기 바랍니다.
- 아스피린계통약, 와파린약은 검사 7일 전에 중단해 주십시오.
- 약을 드시면서 어지럽거나, 탈수증상이 있으시면 바로 응급실로 오십시오.

검사 전날	아침	일반식사 (흰밥 + 건더기 없이 맑은 국)
	점심	흰 죽(건더기 없이)
	저녁	금식
	저녁 7시	저녁 5시, 7시, 9시 총 3회 쿨프렙산 A제와 B제를 통에 넣고 물에 타서 복용합니다. 그 후 물을 3통이상 많이 드십시오.
검사 당일	아침 6시부터 쿨프렙산 A제와 B제를 통에 넣고, 물에 타서 복용 후 물을 2통 드십시오. 가소콜은 병원 출발 직전에 1개 복용합니다.	
주의사항	정확한 검사를 위해서 약과 물 외에는 금식합니다.	

뒷면에 약 복용법 설명이 있습니다!▶▶

쿨프렙산 복용 안내

검사 전날 저녁



저녁 5시 / 7시 / 9시에 총 3회 복용

물 3통이상 더 복용!

물은 최대한 많이 드세요. 보리차, 메밀차, 이온음료 가능
(※파워에이드는 드시지 마세요※)

검사 당일 아침



오전 6시에 1회 복용

물 2통이상 더 복용!



병원 출발 직전 가스콜액 1개 복용 

※ 하제복용 후 마지막 보는 대변 색깔은 소변색보다 흐리게 물처럼 보셔야 하고, 대변색이 진하거나 찌꺼기가 나오는 경우 물을 더 드시고 내시경실로 전화주세요.

☎내시경실 : 본관2층 032)567-6200(내선2260) / 검진센터 내시경실 (내선3401)