

# 대장내시경 검사안내문

## 콜프렙산 복용법

검사자명	
검진일	
내원시간	



평소 심장관련 약 복용 중이거나 혈압이 높은 분의 경우 미리 말씀하여 주시고, 심전도 및 기초검사를 통하여 안전 여부를 미리 파악하오며 수면 유지에 위험이 있다고 판단되어지는 경우 검사가 불가 할 수 있음을 알려드립니다.

### 주의 사항 및 안내사항

- 검사일 3일전부터 물을 수시로 많이 드시는게 좋습니다.
- 대장의 내부가 깨끗하게 되어야 정확한 검사를 편하게 받으실 수 있습니다. 대장이 깨끗하게 청소되지 않으면 검사 도중 대장 내에 많은 공기를 넣기 때문에 고통스러울 수 있습니다.
- 검사전(3일전) 붉은색의 음식이나 고기류 및 씨 많은 과일(참외, 수박, 포도)이나 야채(오이, 콩나물, 호박, 시금치, 고사리 등), 해조류(김, 미역), 잡곡밥은 섭취를 피하시기 바랍니다.
- 아스피린계통약, 와파린약은 검사 7일 전에 중단해 주십시오.
- 약을 드시면서 어지럽거나, 탈수증상이 있으시면 바로 응급실로 오십시오.

### 오전 검사일 경우

검사 전날	아침	일반식사 (흰밥 + 건더기 없이 맑은 국)
	점심 (12시)	흰 죽(건더기 없이)
	저녁	금식
	저녁5시	저녁 5시부터 콜프렙산 A제와 B제를 통에 넣고 물에 타서 3번 복용 후 물을 3통 드십시오.
검사 당일	아침 6시부터 콜프렙산 A제 + B제 + 가스폼액을 통에 넣고, 물에 타서 복용 후 물을 2통 드십시오..	
주의사항	정확한 검사를 위해서 약과 물 외에는 금식합니다.	

### 오후 검사일 경우

검사전날 아침 점심과 저녁	아침	일반식사 (흰밥 + 건더기 없이 맑은 국)
	점심 (12시)	흰 죽(건더기 없이)
	저녁	흰 죽(건더기 없이)
	저녁5시	저녁 5시부터 콜프렙산 A제와 B제를 통에 넣고 물에 타서 2번 복용 후 물을 2통 드십시오.
검사당일 오전 6시 콜프렙산 복용	오전 6시부터 A제와 B제, 가스폼을 같이 통에 넣고 물에 타서 2번 복용 후 물을 2통 드십시오. ※마지막 약 드실 때 가스폼도 함께 타서 드십시오.	
주의사항	정확한 검사를 위해서 약과 물 외에는 금식합니다.	

뒷면에 약 복용법 설명이 있습니다!▶▶

# 쿨프렙산 복용 안내


## 오전 검사일 경우

### 검사 전날 저녁



물 + (쿨프렙산) A제 + B제

오후 5시~주무시기 전까지



그 후에 물 ▶ 3통 더 복용  
(물 많이 드실수록 좋습니다)

### 검사 당일 오전



물 + (쿨프렙산) A제 + B제 + 가소콜

오전 6시에 1회 복용



오전 6시30분 / 오전 7시  
물 ▶ 2회 복용

다음날  
➔

## 오후 검사일 경우

### 검사 전날 저녁



물 + (쿨프렙산) A제 + B제

오후 5시~주무시기 전까지



그 후에 물 ▶ 2통 더 복용  
(물 많이 드실수록 좋습니다)


### 검사 당일 오전



오전 6시  
A제 + B제 + 물  
▶ 1회 복용



오전 6시 30분  
A제 + B제 +  
가소콜 + 물  
▶ 1회 복용



그 후에 물  
▶ 2통 더 복용

다음날  
➔

※ 하제복용 후 마지막 보는 대변 색깔은 소변색보다 흐리게 물처럼 보셔야 하고, 대변색이 진하거나 찌꺼기가 나오는 경우 물을 더 드시고 내시경실로 전화주세요.